

IMPFUNGEN	Säuglinge			Kleinkinder			Kinder			Jugendliche		Erwachsene					
	1,5 Mo.	2 Mo.	3 Mo.	4 Mo.	5 – 10 Mo.	11 Mo. <sup>*1</sup>	12 Mo.	13 – 14 Mo.	15 Mo.	16 – 23 Mo.	2 – 4 J.	5 – 6 J.	7 – 8 J.	9 – 14 J.	15 – 16 J.	17 J.	ab 18 J.
Tetanus, Diphtherie <sup>*2</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>*8</sup>		N			A1	N		A2	N		A (alle 10 Jahre)
Pertussis <sup>*2</sup>		Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung		N			A1			A2			A (einmalig)
Poliomyelitis <sup>*2</sup>			N		N			N			N			A1	N		
Hib (Haemophilus influenzae Typ b) <sup>*2</sup>			N		N			N									
Hepatitis B <sup>*2</sup>		Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung	N			N			N						
Pneumokokken <sup>*3</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>*8</sup>		N									S (einmalig)
Rotaviren <sup>*4</sup>		G1	G2	(G3) <sup>*8</sup>													
Meningokokken (Serotyp C)							G		N								
Masern, Mumps, Röteln (MMR) <sup>*5</sup>						G1		N	G2								S
Varizellen (V)																	
Influenza																	S (jährlich)
HPV (Humane Papillomaviren)														G1 + G2 <sup>*6</sup>	N		
Herpes zoster <sup>*7</sup>																	G1 + G2

**U** Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche

**T** Schluckimpfung

**L** Lebendimpfung  
Sind mehrere Lebendimpfungen erforderlich, entweder gleichzeitig oder mit Mindestabstand von 4 Wochen geben. Keine Lebendimpfung bei Schwangeren!

**G** Grundimmunisierung bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3

**S** Standardimpfung

**A** Auffrischungsimpfung

**N** Nachholimpfung  
Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

\*1 Aufteilung auf mehrere Impftermine möglich.

\*2 Sechsfach-Impfung: Frühgeborene (<37. SSW) erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insg. also 4 Impfdosen für die Grundimmunisierung).

\*3 Pneumokokken: Frühgeborene (<37. SSW) erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insg. also 4 Impfdosen für die Grundimmunisierung). Für die Grundimmunisierung (Kinder) wird der Konjugatimpfstoff, für die Standardimpfung (ab 60 Jahren) der 23-valente Polysaccharidimpfstoff angewendet.

\*4 Rotavirus-Schluckimpfung: 1. Impfung ab dem Alter von 6 Wochen; je nach Impfstoff mit 2 Impfdosen (Rotarix®) bzw. 3 Impfdosen (RotaTeq®) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen.

\*5 MMR: Grundimmunisierung: 1. MMR-Impfung mit zeitgleicher Varizellen-Impfung (an anderer Körperstelle) empfohlen, 2. MMR-Impfung mit MMRV-Kombinationsimpfstoff möglich. Standardimpfung Erwachsener: Einmalige MMR-Impfung nach 1970 geborener Erwachsener mit unklarem Impfstatus, nur einer oder keiner Impfung.

\*6 HPV: Im Alter von 9–14 Jahren 2 Impfungen im Abstand von mind. 5 Monaten. Bei einem Impfabstand <5 Monate oder Beginn der Impfserie im Alter von >14 Jahren ist eine 3. Impfdosis notwendig. Unvollständige HPV-Grundimmunisierungen sollten möglichst auch bei Personen ≥18 Jahre komplettiert werden.

\*7 Herpes zoster: 2 Impfungen mit Totimpfstoff im Abstand von 2–6 Monaten.

\*8 Mindestabstand zur vorherigen Impfdosis: 6 Monate